ta deux fois

Observation

un jeune homme agé de dix huit a vingt ans, Etant ala chasse, voulut tirer un Coup de fusil; lequel Creva a lembouchure du bassinet, et l'eclat du Canon Emporta la platine, lesquels joints ensemble, emporterent le poulce Entier de la main droitte, attendüe quil tiroit a gauche, et une portion du muscle tenar, le tendon flechisseur fut arrachés de son attache au poulce, et resta pendant a sa playe, de la Longueur dun poulce; le doigt Etoit renversé sur le poignet, et il Etoit soutenu par les tendon Extenseur, et par une tres petite portion de la peau qui avoit résisté a léffort; Car toutte la peau a la Circonférence fut déchirée et Contuse; le doigt fut separé dans son articulation davec le premier des os du métacarpe avec lequel il sarticule, comme si lon en avoit fait lemputation Expres; je Coupé les tendon fléchisseur au niveau des chairs, Ensuitte ~~je finis~~ jachevay de Couper le poulce, dememe que les tendons Extenseur; il y Eut tres peu dhemoragie lors de la blessure, et cela nest point Etonnant, tout le monde sait que dans presque touttes les playes darmes afeu, il se fait une Espece de Cauterisation qui Crispe les vaisseaux dans linstant de la blessure; mais lon sait aussy quil survient souvent des hemoragies lors que la chutte des Escarres arrivent; le malade qui fait le sujet de cette observation na pas Esté dans ce Cas, il nen survint point datout;

la main Etoit fort gonflée dememe que lavant bras, il y avoit deux heures que le malade avoit Esté blessé lors que je le pansé, le pancement fut tres simple, je ne mis que du charpy brutte, par dessus, jappliqué un Cataplasme fait avec la mie de pain et léau que je renouvelés de quatre heures en quatre heure jusquau lendemain matin; le malade fut seigné deux fois depuis six heures du soir a minuit, le lendemain matin je le trouvay avec un peu de fievre, la douleur avoit Esté supportable pendant la nuit, la tansion de la main moin forte, mais la main jusques a lavant bras etoit toutte Equimosée; je panée le malade avec un digestif fait avec le beaume dArcéus, le supuratif, la therebentine, lhuille dipericon et quelques gouttes de beaume fioraventy; jappliquay sur larticulation un petit plumaceau tres mince trampé dans lessance de therébantine; je Couvris le tout avec un Cataplasme de mie de pain et déau, et sur la main jappliquay des Compresses, dememe que sur lavant bras trempées

ARC 59
n° 95

dans lesprit de vin et lhuille dhipericon; le malade fut reseignés deux fois dans la journée, et fut mis a une diette tres Exacte; je Continuée les pancements pendant huit jours, la suppuration setablit et meme tres abondante; touttes les chairs qui avoient Esté Contuses, et pour ainsi dire machées, se degorgerent au point que le dixieme jour, je trouvay lextremité dun tendon Extenseur a découvert de la longueur de trois a quatre lignes; sans doutte quil avoit perdu de sa force —— Elastique par lextention forcée ou il avoit Esté tenu pendant deux heures Etant renversé avec le poulce, sans quoy il se seroit retiré vers son principe, comme cela arrive toujours lors quil y a quelque tendon de Couppé dans quelques parties; je Coupay cette Extremité de tendon, et je Continuée les memes pancements, je supprimé les Embrocations avec —— lesprit de vin, et je ne me servis ~~plus~~ que de lhuille dhipericon, —— attendu que lequimose etoit dissipée; je ne me servis plus de Cataplasmes, ji substitué longuent de la mere; la fievre na duré que quatre jours, le malade a toujours Esté de mieux en mieux, et a Esté parfaitement guéris, et larticulation bien recouverte en trante huit jours, malgré le grand chaud, car il fut blessé dans le Commancement du mois daoust.

Mauvaise, Je

n° 18.x